



# 医療の質測定 定義書

更新日：2024年8月21日

K083	鋼線等による直達牽引（初日。観血的に行った場合の手技料を含む。）（1局所につき）	○	○	○	○	○	○	○	○
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

- このうち、大腿骨頸部骨折に対する手術が行われている症例。手術1のKコードが下記に含まれる症例。
- 入院後2日以内の死亡症例を除く。退院時転帰の値として入院後2日以内に以下のいずれかが入力されている症例を除外する

退院時転帰	説明
6	最も医療資源を投入した傷病による死亡
7	最も医療資源を投入した傷病以外による死亡

- 調査対象となる一般病棟への入院の有無が「0」の症例を除く

## 分子の定義

- 分母で同定された手術が、入院から2日以内（入院日を1とする）に施行されている症例

## その他

### 薬剤一覧の出力

いいえ

### リスク調整因子の条件

### 指標の算出方法

分子÷分母

### 指標の単位

パーセント

### 結果提示時の並び順

降順

### 測定上の限界・解釈上の注意

- ガイドラインではできる限り早期の手術を推奨する（Grade B）

## 参考資料

### 参考値

### 参考資料

- 大腿骨頸部／転子部骨折診療ガイドライン 改訂第3版