

事 務 連 絡
令和 5 年 7 月 1 4 日

関 係 各 位

厚生労働省健康局結核感染症課

RS ウイルス感染症予防啓発リーフレットの送付について

日頃より感染症対策へのご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

RS ウイルス感染症については、感染症法に基づく小児科定点医療機関からの患者報告数の増加が見られているところです。この度、別添のとおり RS ウイルス感染症予防啓発のためのリーフレットを作成しましたので、是非ご活用いただき、引き続き RS ウイルス感染症の流行に注意していただきますようお願いいたします。

「RSウイルス感染症」 に注意しましょう。

流行時期

RSウイルス感染症は、近年は夏から増加傾向となり秋にピークがみられていました。一方、2021年以降は春から初夏に継続した増加がみられ、夏にピークがみられています。

感染経路

RSウイルスは接触感染、飛沫感染で感染が広がり、2歳までにほぼ全員が少なくとも1度は感染します。

症状

発熱、鼻汁、咳などの風邪様の症状が数日続き、多くは軽症で回復しますが、重症化した場合は、細気管支炎、肺炎などを起こします。

生後6ヶ月以内の新生児・乳児への感染や、低出生体重児、心臓・肺・神経・筋肉などに基礎疾患がある場合や免疫不全がある場合などには重症化の可能性が高まります。

症状がある 場合

機嫌がよく、つらそうでなければ、慌てずに様子をみたり、かかりつけ医にご相談ください。ただし、呼吸が苦しそう、食事や水分摂取ができない時は医療機関への受診をご検討ください。

受診を迷った場合や夜間・休日の場合は、「こどもの救急」などのWebサイトを参照したり、#8000(こども医療相談)にご相談ください。



こどもの救急

予防

- ・石けんでの手洗い ・アルコール消毒
- ・子どもが日常的に触れるおもちゃなどの消毒
- ・鼻汁、咳などの症状がある場合はマスクの着用

詳しくはこちら

RSウイルス 厚労省

検索

厚生労働省
RSウイルス感染症Q&A

